

TRƯỜNG MẦM NON NINH HOÀ

1. Địa điểm: Trường Mầm non Ninh Hoà.
2. Đối tượng tuyên truyền: Cán bộ giáo viên, nhân viên cùng toàn thể các bậc phụ huynh.
3. Hình thức tuyên truyền: bảng tuyên truyền nhà trường, góc tuyên truyền các lớp, Website.
4. Thời gian tuyên truyền: tuần 4 tháng 12 năm 2025 .
5. Nội dung tuyên truyền:

LỊCH TIÊM CHỦNG CHO BÉ

Kính thưa các bậc phụ huynh!

Để cho các cháu không bỏ sót một mũi tiêm chủng nào các bậc phụ huynh cần nắm cụ thể lịch tiêm chủng cho bé như sau:

LỨA TUỔI	LOẠI VACXIN PHÒNG BỆNH	LỊCH TIÊM
Từ sơ sinh (càng sớm càng tốt)	Lao (BCG)	Mũi 1: Có thể nhắc lại sau 4 năm
	Viêm gan B (Hepatitis B)	Mũi 1
	Bại liệt (Poliomyelitis)	Bại liệt sơ sinh
1 tháng tuổi	Viêm gan B	Mũi 2
2 tháng tuổi	Bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt (Diphtheria, pertussis, tetanus, polio)	Mũi 1
	Viêm màng não mủ, viêm họng, viêm PQ, viêm phổi...do trực khuẩn H.influenza týp b	Mũi 1
	Viêm gan B	Mũi 3 (Một năm sau nhắc lại mũi 4 và 8 năm sau nhắc lại mũi 5)
3 tháng tuổi	Bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt	Mũi 2
	Viêm màng não mủ, viêm họng, viêm PQ, viêm phổi...do trực khuẩn H.influenza týp b	Mũi 2
4 tháng	Bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt	Mũi 3 (nhắc lại sau 1 năm)

tuổi	Viêm màng não mủ, viêm họng, viêm PQ, viêm phổi...do trực khuẩn H.influenza týp b	Mũi 3 (nhắc lại sau 1 năm)
9 tháng tuổi	Vacxin phối hợp sởi, quai bị, rubella (MMR)	Tiêm 1 mũi, 4-6 năm sau tiêm nhắc lại (Khi cần thiết nhắc lại sau 15 tháng)
	Thủy đậu (Varicella)	Tiêm 1 mũi duy nhất (9 tháng – 12 tuổi) Nếu trên 12 tuổi: tiêm 2 mũi (cách nhau 6 – 8 tuần)
12 tháng tuổi	Viêm não Nhật Bản B (Japanese B encephalitis)	Tiêm 3 mũi (2 mũi đầu cách nhau 1-2 tuần và mũi 3 sau 1 năm)
15 tháng tuổi	Vacxin phối hợp sởi, quai bị, rubella (vacxin MMR)	Tiêm 1 mũi (nhắc lại sau 4-5 năm)
18 tháng và người lớn	Viêm màng não do não mô cầu (vacxin A+C meningococcal)	Tiêm 1 mũi (Cứ 3 năm tiêm nhắc lại 1 lần hoặc theo chỉ định khi có dịch)
24 tháng tuổi và người lớn	Viêm gan A (Hepatitis A) = Vacxin Avaxim	Tiêm 2 mũi Từ 2-15 tuổi: khoảng cách giữa 2 mũi là 6 tháng Trên 15 tuổi: khoảng cách giữa 2 mũi là 6-12 tháng
	Viêm phổi, viêm màng não mủ.. do phế cầu khuẩn = vacxin Pneumo 23	Tiêm 1 mũi (Cứ 5 năm nhắc lại 1 lần)
	Thương hàn (Typhoid) = vacxin Typhim Vi	Tiêm 1 mũi. Cứ 3 năm nhắc lại 1 lần
36 tháng và người lớn	Vacxin Cúm = vacxin Vaxigrip Vacxin được tiêm mỗi năm 01 lần, đặc biệt những người có nguy cơ mắc các biến chứng của bệnh cúm. Có thể dùng cho phụ nữ đang cho con bú.	35 tháng tuổi – người lớn 01 liều = 0.5 ml/mỗi năm 06 tháng – 35 tháng tuổi 01 liều = 0.25ml/mỗi năm (trẻ dưới 8 tuổi: chưa mắc cúm hoặc chưa tiêm chủng)

		phải tiêm liều thứ 2 sau 4 tuần)
--	--	----------------------------------

Lưu ý: Vacxin bạch hầu - ho gà - uốn ván - bại liệt nên nhắc lại khi 4 - 6 tuổi, 10 - 11 tuổi và 16 - 21 tuổi.

Tây Hoa Lư, ngày 22 tháng 12 năm 2025

NGƯỜI VIẾT BÀI

HIỆU TRƯỞNG



Bùi Thị Thanh Lý

Hoàng Thị Thu Hường